

PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM MULHERES DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - II

Kellory Lucas da Fonseca
Leticia Lalla Mostasso
Sandra Dias (Orientadora)

Resumo

A International Continence Society define Incontinência Urinária como qualquer perda involuntária de urina e tem origem multifatorial (ABRAMS, 2003). Também considerada como uma condição que afeta dramaticamente a qualidade de vida, comprometendo o bem-estar físico, emocional, psicológico e social do indivíduo. Este estudo está em análise do comitê de ética, terá como objetivo verificar a prevalência de queixas e perdas urinárias em mulheres com diagnóstico em saúde mental frequentadoras de um centro de atendimento psicossocial da região metropolitana de Curitiba-PR. Com a realização deste estudo será possível verificar as principais queixas e fatores associados a uma real perda urinária, assim como a análise da qualidade de vida das mesmas. O estudo será através do método transversal quantitativo, no qual serão entrevistadas mulheres com 18 anos de idade ou mais, diagnóstico em Saúde mental, que estejam frequentando o centro de atendimento psicossocial-II independente de sua modalidade, de uma cidade da região metropolitana de Curitiba-PR, Brasil. Antecedendo a uma breve palestra e explicação sobre incontinência e suas características, individualmente será aplicado os instrumentos desta pesquisa os quais farão parte o International Consultation on Incontinence Questionnaire - Short Form (ICIQ-SF), um questionário com informações complementares, que verificará fatores associados para a incontinência urinária, após utilizaremos o questionário validado e traduzido King's Health Questionnaire (KHQ) para análise da qualidade de vida e ao final o Pad test (MORENO, 2009), um teste simples, que se utiliza de absorvente íntimo durante a realização de um protocolo de exercícios físicos leves para quantificar a real perda urinária. Serão excluídas da coleta, mulheres em crise, apresentando apatia severa ou catatonia, assim como as que estejam incapazes de compreender ao comando verbal simples. Após a coleta de dados, para análise será utilizada estatística descritiva e o teste t de Student para comparação das médias das variáveis quantitativas. Visando análise crítica dos dados obtidos e sua contribuição com a população estudada e profissionais da saúde. Os resultados da pesquisa ainda não foram obtidos.

Palavras-chave: Perda urinária; saúde mental; transtorno psicossocial.